

Penciclovir

von <[H. Martina Lilie](#)>

Penciclovir ist ein synthetisches Nukleosid mit struktureller Ähnlichkeit zu Aciclovir. Es wirkt selektiv in mit HSV 1-infizierten Zellen. Es beschleunigt den Heilungsverlauf von akuten Episoden leichter Formen wiederholt auftretender Herpes labialis-Infektionen. Penciclovir verkürzt signifikant bei Patienten mit leichten Schmerzen ihre Dauer von 4,1 auf 3,5 Tage. Auf die Häufigkeit der Rezidive zeigt Penciclovir keinen Effekt. Ebenso ist die Wirksamkeit bei schweren Verlaufsformen nicht bewiesen.

Handelsname: Fenistil Pencivir® Lippenherpes Creme.

Hersteller: Novartis Ch. V1 Zyma.

Packungsgrößen: 2 g Creme.

Indikation: Rezidivierender Herpes labialis.

Kontraindikationen: Bei Überempfindlichkeit gegen Penciclovir oder Bestandteile, bei Immunsuppression, bei Pat. über 18 Jahre/Schwangerschaft und Stillzeit keine ausreichende Erfahrungen.

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen: Vorübergehendes Brennen, Stiche, Taubheitsgefühl lokal.

Dosierung: In 2-stündigen Abständen (mind. 6-8xtgl.), am 2. Tag möglichst 10-12mal für 4-5 Tage.

Literatur

Field HJ. Famciclovir-origins, progress and prospects. Esp Opin Invest Drugs 1996; 9:925-938.

Spruance SL, Rea TL, Thoming C, Tucker R, Saltzmann R, Boon R. Penciclovir cream for the treatment of herpes simplex labialis: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Med Assoc 1997; 277:1374-79.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: [DNO](#)

© BBS-Verlag Wiesbaden